



# La consultation de santé sexuelle en médecine générale

---

**Dr Samuel ETIEN**

Médecin généraliste – Assistant spécialiste  
à l'hôpital Hôtel-Dieu, Paris.



# Définition : santé sexuelle

« ...un état de bien-être **physique, mental et social** eu égard à la sexualité, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle s'entend comme une **approche positive et respectueuse** de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, **exemptes de coercition, de discrimination et de violence**. Pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués »

Source:  
**OMS, 2006**



# Socio-démographie : la sexualité en France

- Âge médian du premier rapport : femmes 18,2 ans, hommes 17,7 ans

## Pluralité sexuelle et de genre

### L'acceptation sociale de l'homosexualité et de la transidentité

*En 2023, 69,6% des femmes et 56,2% des hommes de 18-89 ans considèrent que l'homosexualité est une sexualité comme les autres*

*En 2023, 41,9% des femmes et 31,6% des hommes de 18-89 ans considèrent que la transidentité est une identité comme une autre*

## Des violences sexuelles de plus en plus déclarées

*En 2023, 29,8% des femmes et 8,7% des hommes de 18-69 ans déclarent avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie*

## Baisse de certains indicateurs d'activité sexuelle

*En 2023, 77,2% des femmes et 81,6% des hommes de 18-69 ans déclarent avoir eu une activité sexuelle avec un partenaire au cours de l'année*

## Légère augmentation de la satisfaction sexuelle

*En 2023, 45,3% des femmes et 39,0% des hommes se déclarent très satisfait-es de leur vie sexuelle actuelle*



**CSF** Contexte des Sexualités en France

---

**Premiers résultats de l'enquête CSF-2023 Inserm - ANRS-MIE**

13 novembre 2024

**anrs** **Inserm** **Santé publique France**

# Table des matières

01

---

Aborder la santé sexuelle **en consultation**

02

**IST** : préventions, dépistages, traitements

03

IST : prévention diversifiée du **VIH**

04

---

La **contraception** en consultation

05

**L'éducation des jeunes** à la santé sexuelle

06

---

Qui peut m'aider ?



JUIN 2024

# « ABORDER LA SANTÉ SEXUELLE EN CONSULTATION »




01

---

Aborder  
la santé sexuelle  
**en consultation**

# Les freins

- Sujets « tabous »
- Sentiment d'illégitimité
- Manque de connaissances
- Peur d'être intrusif.ve
- Confrontation à l'intime
- Difficultés relationnelles liées aux rapports d'âge, de genre, d'orientation sexuelle
- Peur de l'érotisation du soin
- Méconnaissance des réseaux
- Manque de temps



# Les principes

## PAS DE NORMALITÉ CONCERNANT LA SEXUALITÉ

*Tant qu'il y a: respect de l'autre (consentement) et respect de la Loi*

*Quelques règles et astuces:*

- Climat de confiance : consultation individuelle, confidentialité, empathie et bienveillance, **affiches et dépliants dans la salle d'attente**
- Expliquer le but des démarches et des questions
- **Questions ouvertes**
- Prendre en compte le vécu avec des questions dédiées
- Examen clinique non nécessaire (*dans la plupart des cas*)
- Ne pas choisir à la place des personnes



# Repérage précoce et intervention brève (RPIB)

1. « Avec votre accord, je vous propose que nous abordions la question de la santé sexuelle »
2. Poser les questions de repérage sur :
  - La sexualité habituelle et les problèmes rencontrés
  - L'exposition aux risques
  - Les troubles et dysfonctions
  - Les violences
3. Complément d'information à donner en fonction des réponses
4. Parler réduction des risques : selon le patient et selon vous
5. Proposer des objectifs et des méthodes : choix du patient
6. Faire un résumé
7. Proposer une orientation, une prescription, un nouveau rendez-vous
8. Maintenir son soutien et sa disponibilité
9. Remettre de la documentation ciblée



# Premier recours en sexologie

Se former aux connaissances minimales des troubles et comportements sexuels pour **orienter**.


Définitions :

- Sexe
- Identité de genre
- Orientation sexuelle
- Pratiques sexuelles

Troubles :

- Troubles douloureux
- Troubles du désir et de l'excitation
- Troubles du plaisir et de l'accès à l'orgasme

Orientations vers des ressources validées.



# Exemple : Questions santé sexuelle en 5 minutes

## Aborder systématiquement lors d'une première consultation.

Intégrer ces questions après le recueil des antécédents personnels et familiaux.

- Êtes-vous en relation ?
- Êtes-vous satisfait.e de votre sexualité ?
- Êtes-vous sexuellement actif.ve ?
- Combien de partenaires différent.e.s avez-vous eu au cours des 12 derniers mois ?
- A quelle fréquence utilisez-vous un ou des moyens de protection contre les IST dans vos rapports ?
- Avez-vous déjà effectué un test de dépistage d'une ou plusieurs IST ?
- *Si oui*: de quand date votre dernier test et quels en étaient les résultats ?
- Vous a-t-on déjà diagnostiqué une IST ? (*Si oui : détailler date, diagnostic et traitement reçu*)

### *Et selon le contexte :*

- Utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé la PrEP ?
- Pratiquez-vous le chemsex ?
- Avez-vous déjà eu recours à un traitement post-exposition contre le VIH ?
- Avez-vous déjà eu recours à une contraception d'urgence ?



*Les questions relatives à la contraception pourront être associées à l'entretien gynécologique.*

# Questions santé sexuelle : **violence(s)**

**Aborder systématiquement lors d'une première consultation la question de la violence.**

La méthode pour l'aborder dépendra de la situation et du.de la patient.e

Aides possibles : questionnaires (type WAST)

*Si une situation violente est dépistée, un signalement peut être fait dans plusieurs conditions :*

- *Personne mineure*
- *Violences conjugales avec critères suffisants de danger immédiat et d'emprise*



## Questionnaire WAST

Ces questions portent sur les 12 derniers mois.

1. En général, comment décririez-vous votre relation avec votre conjoint ?
  - Très tendue
  - Assez tendue
  - Sans tension
2. Comment vous et votre conjoint arrivez-vous à résoudre vos disputes ?
  - Très difficilement
  - Assez difficilement
  - Sans difficulté
3. Les disputes avec votre conjoint font-elles que vous vous sentez rabaisée ou que vous vous sentez dévalorisée ?
  - Souvent
  - Parfois
  - Jamais
4. Les disputes avec votre conjoint se terminent-elles par le fait d'être frappée, de recevoir des coups de pieds ou d'être poussée (bousculée) ?
  - Souvent
  - Parfois
  - Jamais
5. Vous êtes-vous déjà sentie effrayée par ce que votre conjoint dit ou fait ?
  - Souvent
  - Parfois
  - Jamais
6. Votre conjoint vous a-t-il déjà maltraitée physiquement ?
  - Souvent
  - Parfois
  - Jamais
7. Votre conjoint a-t-il déjà abusé de vous psychologiquement ?
  - Souvent
  - Parfois
  - Jamais
8. Votre conjoint a-t-il déjà abusé de vous sexuellement ?
  - Souvent
  - Parfois
  - Jamais

WAST : Woman Abuse Screening Tool.

# Questions santé sexuelle : **publics particuliers**

Adolescents et jeunes adultes

Migrant.e

Personnes en situation de handicap

Personnes âgées

Personnes atteintes de pathologie(s) chronique(s) (diabète, maladie cardio-vasculaire)

Communautés LGBTQIA+

Une vie sexuelle qui se prolonge  
aux âges avancés

En 2023, 56,6% des femmes et 73,8% des hommes  
restent actifs sexuellement entre 50 et 89 ans

## Pluralité sexuelle et de genre et santé

Les personnes ayant eu des rapports sexuels avec des personnes de même sexe et les personnes qui ont pensé à changer de genre sont exposées à des risques liés à la sexualité plus élevés, en particulier les violences sexuelles, qui contribuent à la dégradation de leur état de santé mentale.

# Focus publics particuliers : **personnes trans**

## Accueil sans discrimination

Formations possibles



- Connaissances de base à acquérir
- Vocabulaire : homme/femme trans, personne transmasculine ou transféminine, deadname...
- Des risques majorés (IST, violence, psy...)
- Parcours administratifs
- Modalités de l'**hormonothérapie**
- **Professionnels de recours** (Pitié-Salpêtrière : TRANSEND, Florence MENESGUEN ou Tenon (Dr JOHNSON))  
[secretariat.transparis6@aphp.fr](mailto:secretariat.transparis6@aphp.fr) pour l'hormonothérapie)

### Personnes trans et personnes ayant pensé à changer de genre

*En 2023, 1 personne sur mille a entrepris des démarches pour changer de genre et 2,3% des femmes et 2,4% des hommes déclarent avoir pensé à changer de genre*

### Prise en charge des personnes transgenres

Publié le Mardi 05 novembre 2024 • Temps de lecture : 1 mn



L'Ordre des médecins rappelle le devoir déontologique de prendre en charge les personnes transgenres sans discrimination

### UN ACCOMPAGNEMENT POUR FAVORISER VOTRE AUTONOMIE

Florence MENESGUEN

01.42.16.57.87

06.25.30.16.44

© coordinateur-  
transend.ie3m@aphp.fr

Nous souhaitons vous aider à « trouver vos marques » dans l'Institut E3M. Notre coordinatrice de parcours de soin vous accueillera lors de votre première venue à l'Institut E3M pour vous présenter le fonctionnement des services de médecine adulte, et accompagnera votre parcours.

La coordinatrice anime un espace d'accueil entièrement dédié aux jeunes adultes en transition à l'Institut E3M.

# Focus publics particuliers : HSH

Particularités suivant les pratiques et le nombre de partenaires  
Le terme « HSH » ne suffit pas à définir la personne, il faut **contextualiser**.

- Un des publics cibles pour une utilisation de la PrEP
- Information primordiale sur le TPE
- Dépistage et prise en charge des pratiques de chemsex (+ RDR)
- Adaptation de la vaccination (VHA)
- Organisation d'un suivi et de dépistages



# Focus publics particuliers : **TDS**

Travailleur.euse.s du sexe

Surexposition aux IST : notamment VIH et VHB

Situations de précarité

Problématiques de santé reproductive (IVG contraception)

**Marginalisation** : éloignement du système de santé

Nécessité de « **l'aller vers** »


- Organiser actions de prévention sur le terrain
- Adapter l'accessibilité aux soins



# Focus publics particuliers : FSF

Ici, le terme « FSF » qui n'est pas utilisé, rassemble les personnes se définissant comme femmes homosexuelles, bisexuelles ou curieuses.

Population souvent « oubliée »  
Risques liés à la sexualité souvent ignorés



**Etre lesbienne ne protège pas des Infections sexuellement Transmissibles (IST) !**

© Marjyas Sacha

Les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes ne sont pas « immunisées » par leurs pratiques sexuelles. C'est une idée reçue très répandue, et malheureusement aussi parmi les professionnelles de santé, les pouvoirs publics et les associations. Ces représentations reposent entre autres sur une conception réductrice de la sexualité des femmes entre elles.

Par ailleurs, avoir des rapports sexuels avec des femmes n'exclut pas la possibilité d'avoir une sexualité avec des hommes cis et/ou des personnes trans. D'autres pratiques peuvent aussi être une source de contamination par les virus des hépatites B et C (échange de pailles, tatouage et piercing sans matériel stérile...) et/ou par le virus du VIH (échanges de seringues). La dernière enquête Contexte de la sexualité en France (2016) montre que les femmes qui déclarent des pratiques homosexuelles ont un nombre plus important de partenaires sexuels (notamment masculins) que les autres IST se transmettent aussi lors des rapports sexuels entre femmes.

Même si il y a très peu de risques de transmission du VIH/sida, (surtout liés au sexe en période de règles ou à des pratiques avec du sang), les autres IST se transmettent aussi lors des rapports sexuels entre femmes.

Par ailleurs, avoir des rapports sexuels avec des femmes n'exclut pas la possibilité d'avoir une sexualité avec des hommes cis et/ou des personnes trans. D'autres pratiques peuvent aussi être une source de contamination par les virus des hépatites B et C (échange de pailles, tatouage et piercing sans matériel stérile...) et/ou par le virus du VIH (échanges de seringues). La dernière enquête Contexte de la sexualité en France (2016) montre que les femmes qui déclarent des pratiques homosexuelles ont un nombre plus important de partenaires sexuels (notamment masculins) que les autres IST se transmettent aussi lors des rapports sexuels entre femmes.

Même si il y a très peu de risques de transmission du VIH/sida, (surtout liés au sexe en période de règles ou à des pratiques avec du sang), les autres IST se transmettent aussi lors des rapports sexuels entre femmes.



CHECK !	Je l'ai fait le	Prochaine visite
<input type="checkbox"/> Dépistage du VIH (prise de sang, TROD*, autotest*)	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Dépistage de la syphilis (prise de sang)	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Dépistage de l'hépatite B (prise de sang)	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Dépistage de l'hépatite C (prise de sang)	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Dépistage des Chlamydiae (prélèvement buccal et /ou vaginal)	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Dépistage des gonocoques (prélèvement vaginal et/ou buccal)	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Frottis gynécologique (un frottis est conseillé tous les 3 ans).	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Je suis vaccinée contre l'Hépatite A	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Je suis vaccinée contre l'hépatite B	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> Je suis vaccinée contre le Papillomavirus (HPV)	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> J'ai des relations sexuelles avec des hommes cisgenres et ne veut pas avoir d'enfants, j'ai donc un moyen de contraception adapté à mes besoins.	___/___/___	___/___/___
<input type="checkbox"/> J'ai été faire une mammographie (conseillée pour les femmes de plus de 45 ans tous les 2 ans).	___/___/___	___/___/___

# Focus : violences envers les LGBT+

Préfecture de police de Paris : officier de liaison LGBT

Mickaël Bucheron : [mickael.bucheron@interieur.gouv.fr](mailto:mickael.bucheron@interieur.gouv.fr)


Téléphone : 06 37 98 17 47

Sur rendez-vous uniquement.


Présentation : <https://www.youtube.com/watch?v=KF4eXk4z6Cc>



# Focus publics particuliers : Femmes migrantes / MGF



PREVALENCE DES MUTILATIONS SEXUELLES FEMMINES DANS LE MONDE



Kit de formation : <https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/outils-mutilations-sexuelles-femmines#download-form>





Risques liés aux infections  
sexuellement transmissibles

Une baisse de la prévention en début de vie sexuelle

*En 2023, 75,2 % des femmes et 84,5 % des hommes utilisent un  
préservatif lors de leur premier rapport sexuel*

02

---


**IST**  
Préventions,  
dépistages, traitements

# Vaccination en santé sexuelle



**VHB**

Population générale.



**VHA**

Populations à risque.



**HPV**

Population générale.



**MPox**

Populations à risque.

## Une couverture vaccinale insuffisante

*En 2023, 63,5% des femmes et 52,9% des hommes de 15-29 ans sont vaccinés contre l'hépatite B, tandis que 50,6% des femmes et 20,2% des hommes du même âge sont vaccinés contre les papillomavirus*



# Vaccination : VHB

## Take home messages




- Vaccination obligatoire en population générale
- 135 000 infections **chroniques** au VHB en France dont **17,5% sont diagnostiquées**
- 90 % des infections de l'adulte sont aiguës et guérissent spontanément
- 1 % des infections aiguës se traduisent par une hépatite fulminante
- 90 % des infections néonatale deviennent chroniques
- Cause majeure de **cirrhose** et **carcinome hépato-cellulaire** (1ère cause mondiale)
- Transmission : sang, rapports sexuels, mère-enfant
- Contagiosité : 50 à 100 fois plus que le VIH
- Dépistage chez tout le monde, même si antécédent vaccinal sur le carnet de vaccination.
- Rattrapage vaccinal jusqu'à 15 ans recommandés
- En pratique : vaccination des populations à risque si non immunisées
- Schéma vaccinal : classique M0, M1, M6 ou accéléré J0 J7 J21 (rappel M12)



# Vaccination : VHA

## Take home messages



- **Vaccination des populations à risque** : HSH, enfants nés de parents originaires de zone endémique, jeunes avec handicap en institution, hépatopathie chronique, mucoviscidose, immunosuppression.
- Forme aiguë (syndrome grippal, ictère) ou suraiguë (fulminante)
- Déclaration obligatoire en France (2015)
- Pas de traitement
- Contamination oro-fécale
- Schéma vaccinal : (exemple HAVRIX 1440) M0 et M>6
- Vaccination **sujets contacts** : dans les 14 jours après le diagnostic du cas index.




# Vaccination : HPV



## Take home messages

- Vaccination en population générale
  - **Tous les adolescents : 11-14 ans**, rattrapage jusqu'à 19 ans
  - HSH : extension du rattrapage jusqu'à 26 ans
  - Limite d'âge = pour le remboursement par la sécurité sociale
- 80 % de la population sexuellement active contractera l'infection
- 90 % de guérison spontanée
- 7 HPV oncogènes (HR) et 2 HPV provoquant des condylomes / > 200 HPV
- Vaccin : GARDASIL9
- Pas de prise en compte du début de la vie sexuelle



# Vaccination : Mpox



## Take home messages

- **Mpox : épidémie en 2022**
- Famille du virus de la variole (éradiqué en 1980 grâce à la vaccination)
- Vaccination : contrôle rapide des épidémies
- “Variole du singe” connue depuis 70 ans
- Epidémies africaines annuelles
- Symptômes : fièvre, éruption vésiculaire, atteintes respiratoires, neurologiques
- Fin 2023 : 89 000 cas dans le monde (5000 en France) / **2025 : Mpox 1b**
- AMM vaccination contre le Mpox : 2013
- Cibles vaccinales :
  - Post exposition
  - Populations à risque (pré-exposition) : HSH et trans à partenaires multiples, TDS, professionnels des lieux de consommation sexuelle
- Schémas vaccinaux :
  - Personne née avant 1980 : 1 dose
  - Personne née après 1980 : 2 doses (M0 M1)
  - Personne immunodéprimée : 3 doses (M0 M1 M2)



Fig. 1. Typical clinical presentation of human monkeypox in a 7-y-old female child, Sankuru District, Democratic Republic of Congo.



# Vaccination : Mpox



Doute sur un patient à risque  
symptomatique ?

**MPOX INFO SERVICE 0 801 90 80 69** est un dispositif téléphonique géré par SIS-Association, spécialiste de l'aide à distance en santé depuis plus de 30 ans. SIS-Association gère, entre autres, les dispositifs comme Sida Info Service, Hépatites Info Service ou Sexualités Info Santé.

**MPOX  
INFO SERVICE  
0 801 90 80 69**

**0 801 90 80 69** Service & appel  
gratuits



Fig. 1. Typical clinical presentation of human monkeypox in a 7-y-old female child, Sankuru District, Democratic Republic of Congo.



# Vaccination : Gonocoque ?

---

## Effectiveness of a group B outer membrane vesicle meningococcal vaccine against gonorrhoea in New Zealand: a retrospective case-control study



*Helen Petousis-Harris, Janine Paynter, Jane Morgan, Peter Saxton, Barbara McArdle, Felicity Goodyear-Smith, Steven Black*

- **31% d'efficacité du vaccin anti-méningocoque B contre le gonocoque**
- MeNZB : vaccin développé en Nouvelle-Zélande pour lutter contre le méningocoque B
- Evolution : 4CMenB (4 composantes comprenant OMV) : BEXSERO



# Prévention : préservatifs gratuits

Préservatifs gratuits sans ordonnance jusqu'à 26 ans (pas de minimum d'âge)

## Préservatifs externes :

- Marques : « **Eden** » (01/01/2023), « **Sortez couverts !** » (01/01/2023), « **Be Loved** » (22/11/2023), « **Terpan** » (18/03/2024), « **Manix** » (30/04/2024).
- *Remboursement à 60% sur ordonnance après 26 ans.*



## Préservatifs internes :

- Marques : « **Ormelle** » (09/01/2024), « **So sexy & smile** » (04/04/2024)
- *Remboursement à 60% sur ordonnance après 26 ans.*



# VIH : prévention diversifiée

## *Cf. partie 3*

- Dépistage du VIH
- Préservatifs
- PrEP
- TPE
- Réduction des risques chez les consommateurs
- TasP



# IST : dépistage

## Dépistage gratuit sans ordonnance (- 26 ans)

### MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 8 juillet 2024 fixant la liste des infections sexuellement transmissibles dépistées à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale et les modalités de ces dépistages

NOR : TSSP2417443A

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3121-1, L. 6211-7 et L. 6211-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-13-2 ;

Vu les recommandations de la Haute Autorité de santé en date du 2 juillet 2007, 11 mars 2011, 16 janvier 2012 et 23 octobre 2018 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 23 mai 2024,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Les infections sexuellement transmissibles autres que le virus de l'immunodéficience humaine, dont le dépistage est réalisé à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale conformément au deuxième alinéa de l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale sont :

- l'infection par *Neisseria gonorrhoeae* ;
- l'infection par *Chlamydia trachomatis* ;
- l'infection par *Treponema pallidum* (la syphilis) ;
- l'infection par le virus de l'hépatite B.

Et si vous le faisiez ici et maintenant ?



Sans ordonnance  
Sans rendez-vous  
Sans frais pour les -26 ans

**VIH/sida, hépatite B, syphilis, gonorrhée et chlamydiae :**  
votre laboratoire vous propose un dépistage de certaines infections sexuellement transmissibles (IST) adapté à vos besoins.

Plus d'informations à l'accueil et sur [ameli.fr](https://www.ameli.fr).

# IST : dépistage

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage
- Des facteurs de risque du patient
- Des pratiques sexuelles

#### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

#### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **exemple**

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage

Si **RSNP fréquents, imprévisibles, multipartenaires, patient.e ne prenant pas la PrEP**



### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **exemple**

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage

Si **RSNP fréquents, imprévisibles, multipartenaires, patient.e ne prenant pas la PrEP**

On réalisera le dépistage immédiatement et on proposera de le renouveler tous les 3 à 6 mois (selon le nombre de RS). *On proposera également la PrEP.*



### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **exemple**

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage

Si **RSNP fréquents, imprévisibles, monopartenaire, patient.e ne prenant pas la PrEP**



### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **exemple**

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage

### Si **RSNP fréquents, imprévisibles, monopartenaire, patient.e ne prenant pas la PrEP**

On réalisera le dépistage immédiatement chez les deux partenaires et dans 3 mois si début des RS < 2 mois.



#### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

#### Faire réaliser en laboratoire :

##### **Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **exemple**

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage

### Si **RSNP occasionnels**

#### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

#### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **exemple**

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage

### Si **RSNP occasionnels**

On réalisera le dépistage immédiatement et on proposera de le renouveler **6 semaines plus tard si dernier rapport récent** en conseillant le maintien de l'usage du préservatif dans l'intervalle.



#### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

#### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **exemple**

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage

### Si **tous les RS** sont protégés

#### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

#### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **exemple**

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Du temps passé entre le dernier rapport à risque et le dépistage

### Si **tous les RS sont protégés**

On réalisera le dépistage tout de suite puis à la demande.



#### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

#### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Des facteurs de risque du patient
- Des pratiques sexuelles

## VIH 1 et 2 : à chaque dépistage chez tout le monde



### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

### Sérologie VIH 1 et 2

Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)

Sérologie VHC

Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Des facteurs de risque du patient
- Des pratiques sexuelles

**Syphilis**: à chaque dépistage chez tout le monde

### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2

Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)

Sérologie VHC

**Sérologie Syphilis**

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Des facteurs de risque du patient
- Des pratiques sexuelles

**VHB**: au premier dépistage, **même si vaccination.**

Si immunité (*anti-HBs* > 10 mUI/L) sur précédent prélèvement : pas de nouveau dosage

Si absence d'immunité : proposer la vaccination.



### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claudexemple@orange.fr

04 74 00 00 00

06 00 00 00 00

### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2

**Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)**

Sérologie VHC

Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU 15  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Des facteurs de risque du patient
- Des pratiques sexuelles

**VHC**: au premier dépistage.

### *Puis*

- un dosage par an en population générale
- **Plus fréquent en population à risque** (HSH, TDS, chemsex, UDD, BDSM, FF...)



### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2

Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)

**Sérologie VHC**

Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage

## Quelle ordonnance pour un dépistage ?

### L'ordonnance dépend

- Des facteurs de risque du patient
- Des pratiques sexuelles

### Chlamydia / Gonocoque

Par auto-prélèvement sur les sites en contact sexuel

- Premier jet urinaire (si pénis) **rétenion > 2 heures**
- Ecouvillon vaginal (si vagin)
- Ecouvillon pharyngé
- Ecouvillon anal



#### DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claude.exemple@orange.fr

☎ 04 74 00 00 00

📞 06 00 00 00 00

#### Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

#### **Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :**

- **PCR chlamydia trachomatis**
- **PCR neisseria gonorrhoea**

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*



EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.



# IST : dépistage, **ASTUCE**

**Certain.e.s patient.e.s peuvent ne pas être à l'aise avec l'abond de leur sexualité en consultation mais souhaiter réaliser un dépistage.**

Il est possible de créer des **ordonnances pré-remplies et pré-signées**, en laissant l'espace pour le nom et prénom de la personne, qu'elle inscrira elle-même.

Ce paquet d'ordonnances peut, par exemple, être laissé **en salle d'attente**.



## DOCTEUR / CABINET DE SOINS

Claude EXEMPLE

Spécialité, diplômes ou autres

153, rue des Belles Feuilles  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
claudexemple@orange.fr

04 74 00 00 00

06 00 00 00 00

Nom : .....

Prénom : .....

Faire réaliser en laboratoire :

**Au moins 1 semaine avant la consultation médicale**

Sérologie VIH 1 et 2  
Sérologie VHB (Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs)  
Sérologie VHC  
Sérologie Syphilis

Sur auto-prélèvement (1, 2 ou 3 sites) :

- PCR chlamydia trachomatis
- PCR neisseria gonorrhoea

*Merci de transmettre les résultats par email : ....@mssante.fr*

Dr EXEMPLE




EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU **15**  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE.  
LE RÉGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUES EST ACCEPTÉ.




# IST : dépistage HPV et lésions du col utérin

FEMMES DE 25 À 29 ANS



FEMMES DE 30 À 65 ANS



# IST : traitement

## **VIH positif**

Adressage en consultation d'infectiologie

*Cf. Partie 3 « TasP »*



# IST : traitement

## **VHB positif**

Adressage en consultation d'infectiologie ou hépatologie

*Si vous êtes formés et à l'aise, vous pouvez débiter le bilan complémentaire d'un patient présentant un Ag HBs positif*




# IST : VHB chronique

- **AgHBs +**                    **anticorps anti-HBc +**                    **anticorps anti-HBs -**
- Ou : **AgHBs -**                    **anticorps anti-HBc +**                    **anticorps anti-HBs -**                    **ADN viral VHB positif**
- *Depuis plus de 6 mois*

**Pour les IMG intéressé.e.s** : formation envisageable sur la prise en charge du VHB chronique en médecine de ville / Notamment PEC des personnes migrantes originaires d'Afrique de l'Ouest

- Quel bilan complémentaire
- Comment faire l'annonce
- Exemple d'outils pour l'ETP
- Comment organiser le suivi ?
- Quand adresser au spécialiste ?



# IST : traitement

## VHC positif

Possibilité de bilan initial en ville :

- Evaluation des comorbidités
- Bilan complémentaire : NFS, GAJ, BHC, créatininémie DFG, ARN VHC.
- Fibroscan (élastométrie ultrasonore)

Si **coinfection VIH / VHB, DFG < 30 ml/min, comorbidité** : **adressage infectiologue / hépatologue**  
Sinon :

**EPCLUSA** 1 cp/jour à heure fixe, avec ou sans repas, sans croquer, pendant **12 semaines**  
**MAVIRET** 3 cp/jour à heure fixe, avec un repas, sans croquer, pendant **8 semaines**

● **EVALUER LE RISQUE D'INOBSERVANCE AVANT DE PRESCRIRE**



# IST : traitement

## VHC positif

**EPCLUSA** 1 cp/jour à heure fixe, avec ou sans repas, sans croquer, pendant **12 semaines**

**MAVIRET** 3 cp/jour à heure fixe, avec un repas, sans croquer, pendant **8 semaines**

### EVALUER LE RISQUE D'INOBSERVANCE AVANT DE PRESCRIRE

#### Présentations du médicament EPCLUSA

**EPCLUSA 150 mg/37,5 mg** : granulés enrobés ; boîte de 28 sachets  
Sur ordonnance (Liste I), médicament à prescription restreinte - Remboursable à 100 % - Prix : 7484,08 €.

**EPCLUSA 200 mg/50 mg** : granulés enrobés ; boîte de 28 sachets  
Sur ordonnance (Liste I), médicament à prescription restreinte - Remboursable à 100 % - Prix : 7484,08 €.

**EPCLUSA 200 mg/50 mg** : comprimé (rose) ; boîte de 28  
Sur ordonnance (Liste I), médicament à prescription restreinte - Remboursable à 100 % - Prix : 7484,08 €.

**EPCLUSA 400 mg/100 mg** : comprimé (rose) ; boîte de 28  
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 100 % - Prix : 7484,08 €.

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

#### Présentations du médicament MAVIRET

**MAVIRET 50 mg/20 mg** : granulés ; boîte de 28 sachets  
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 100 % - Prix : 2889,58 €.

**MAVIRET 100 mg/40 mg** : comprimé (rose) ; boîte de 84  
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 100 % - Prix : 11159,68 €.

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

# IST : traitement

## VHC positif

Après le traitement :

**ARN du VHC** (charge virale) à doser **3 mois après** la fin du traitement

Si ARN indétectable : patient guéri

Si **ARN détectable** : **adressage infectiologue / hépatologue**

**Efficacité : 99,8% de guérison**



# IST : traitement

## Syphilis positive

**Précoce** = primaire (chancre) ou secondaire (cutané tronc et visage)

ou

**Latente tardive** = asymptomatique + indatable ou > 1 an



# IST : traitement

## Syphilis positive

### Précoce

**BENZATHINE-BENZYL PÉNICILLINE 2,4 M UI (fl. 5mL)** Poudre et solvant pour solution injectable  
**1 injection unique** de 2,4 MUI en intramusculaire profonde dans le muscle fessier par IDE + 2cc de LIDOCAÏNE NON ADRENALINÉE 1%

*Si allergie pénicilline :*

**DOXYCYCLINE cp 200 mg** : 1 prise par jour, à heure fixe, pendant 14 jours.



**REACTION D'HERXHEIMER** (fièvre, céphalée, éruption) : **prévenir le patient et prescrire PARACETAMOL**

**Ne pas confondre avec une allergie aux bêta-lactamines.**



# IST : traitement

## Syphilis positive

### Latente tardive

**BENZATHINE-BENZYL PÉNICILLINE 2,4 M UI (fl. 5mL)** Poudre et solvant pour solution injectable

**1 injection par semaine pendant 3 semaines** de 2,4 MUI en intramusculaire profonde dans le muscle fessier par IDE + 2cc de LIDOCAÏNE NON ADRENALINÉE 1%

*Si allergie pénicilline :*

**DOXYCYCLINE cp 200 mg** : 1 prise par jour, à heure fixe, pendant **28 jours**.



# IST : traitement

**Neisseria gonorrhoea**

**CEFTRIAXONE 1000 mg Poudre et solvant pour solution injectable**

**1 injection unique** de 1000 mg en intramusculaire profonde dans le muscle fessier par IDE + 2cc de LIDOCAÏNE NON ADRENALINÉE 1%



# IST : traitement

## Prévalence des IST en population générale

*En 2023, la prévalence de l'infection à Chlamydia est de 2,2% chez les femmes de 18 à 29 ans et 1,9% chez les hommes du même âge*

## Chlamydia trachomatis

### Risque d'observance :

**AZITHROMYCINE MONODOSE cp 250 mg**

4 comprimés à prendre en une seule prise, en-dehors ou lors d'un repas.

### Personne observante :

**DOXYCYCLINE cp 100 mg**

1 prise matin et soir, à heure fixe, pendant 7 jours.

### PCR positive sur prélèvement anal :

**DOXYCYCLINE cp 100 mg**

1 prise matin et soir, à heure fixe, pendant **21 jours**.

Photosensibilisant

LGV

# IST : traitement, cas particulier

## Doit-on traiter le *Mycoplasma genitalium* ?

- 1 à 2 % de prévalence (environ 10% dans les séries de PrEPeurs)
- Risque : épididymite et infertilité chez la femme
- Dépistage si **symptomatique** (urétrite ou syndrome inflammatoire pelvien)
- Traitement de l'entourage même si asymptomatique
- Traitement recommandé : AZITHROMYCINE ou DOXYCYCLINE
- **Grande résistance à l'AZITHROMYCINE** (> 60% dans les séries récentes)

1<sup>ère</sup> ligne : AZITHROMYCINE 500mg J1 puis 250mg J2, J3, J4, J5

2<sup>ème</sup> ligne : résistance à J5 : MOXIFLOXACINE 400 mg/jour pendant 14 jours

3<sup>ème</sup> ligne : DOXYCYCLINE 100mg x 2 / jour pendant 14 jours

# Dépistage et traitement des partenaires

## Cas général

Proposer un dépistage des partenaires rencontrés sur les **3 derniers mois**

Si syphilis latente tardive : partenaires des **24 derniers mois**

Possibilité de remettre une ordonnance pré-remplie...

**IST**  
**Je l'informe**

*Anonyme et gratuit,  
assurez la santé de tous  
en un simple message !*

Découvrez notre outil gratuit de notification par SMS aux partenaires en cas d'IST. Cet outil vous permet d'informer de façon anonyme vos partenaires sexuels si vous êtes dépisté positif pour une IST et que vous n'osez pas le faire. Un SMS est envoyé leur suggérant de se faire dépister à leur tour.

Retrouvez également sur notre site des centres de dépistage proches de chez vous.

Bonjour, une de vos partenaires a récemment été dépistée positive à une IST et vous conseillons de vous faire dépister également. Vous pouvez consulter un médecin pour une consultation avec prescription de dépistage, ou aller dans un CeGIDD (gratuit), adresses sur : [www.notification-partenaire.fr](http://www.notification-partenaire.fr)

Flashez le QR code pour accéder au site [www.notification-partenaire.fr](http://www.notification-partenaire.fr)

SIDA Info Service.org  
0 800 840 800  
appel confidentiel, anonyme et gratuit

SFIS

# Contrôle efficacité des traitements curatifs

## Après traitement antibiotique ou antiviral curatif

Syphilis : **3 mois** (normalisation du VDRL, soit  $\leq 8$ )

VHC : **3 mois** (ARN viral négatif)


Chlamydia : **4 semaines** (PCR négative)

Gonocoque : **4 semaines** (PCR négative)

Mycoplasme : **4 semaines** (PCR négative)







03

---

## Prévention diversifiée du VIH

# Prévention : préservatifs gratuits

Préservatifs **gratuits sans ordonnance jusqu'à 26 ans** (pas de minimum d'âge)

## Préservatifs externes :

- Marques : « **Eden** » (01/01/2023), « **Sortez couverts !** » (01/01/2023), « **Be Loved** » (22/11/2023), « **Terpan** » (18/03/2024), « **Manix** » (30/04/2024).
- *Remboursement à 60% sur ordonnance après 26 ans.*



## Préservatifs internes :

- Marques : « **Ormelle** » (09/01/2024), « **So sexy & smile** » (04/04/2024)
- *Remboursement à 60% sur ordonnance après 26 ans.*



# Dépistage du VIH



## Sérologie (ELISA)

Si risque > 6 semaines

Ag P24  
Anticorps anti-VIH-1  
Anticorps anti-VIH-2

**Si positif : confirmation par WB**



## TROD VIH

Si risque > 3 mois

*En pharmacie, Cegidd, PMI,  
associations*

**Chaque test capillaire positif nécessitera un contrôle par  
ELISA puis confirmation par WB**



## Autotest VIH

Si risque > 3 mois


*En pharmacie, Cegidd, PMI,  
associations*

# TasP

## Treatment as prevention

## Rappel sur les traitements

**ARV disponibles (ou en ATU) en 2022 (Corinne Amiel)**



**Inhibiteurs d'entrée**

- Inhib de fusion (T20) — ENF — enfuvirtidine
- Inhib de CCR5 — MVC — maraviroc
- Inhib d'attachement (AI)
  - liaison gp120 : prodrogue lemsavir — FTR — fostemsavir\*
  - liaison CD4 : AcM humanisé — ibalizumab 1 IV/15j
  - liaison gp120 : bNAbs (broadly neutral Ab)

**Inhib nucl de la RT (NRTI)**

AZT	zidovudine
ddl	didanosine
d4T	stavudine
3TC	lamivudine
FTC	emtricitabine
ABC	abacavir
TDF	tenofovir
TAF	teno alafenamide**

**Inhib non nucl de la RT (NNRTI)**

NVP	nevirapine
EFV	efavirenz
ETR	etravirine
RPV	rilpivirine
DRV	daravirine
RPV	injectable*

**Boost**

RTV	ritonavir
Cobicistat	

**Inhibiteurs intégrase (INI)**

EVG	elvitegravir
RAL	raltegravir
DTG	dolutegravir
BCG	bictegravir
CTG	cabotegravir inj*

**Inhibiteurs de protéase (PI)**

SQV	saquinavir
IDV	indinavir
NFV	nellinavir
APV	ampranavir
FPV	fosamprenavir
TPV	tipranavir
LPV	lopinavir
ATV	atazanavir
DRV	darunavir

**Formes combinées ou STR**

AZT/3TC	
AZT/3TC/ABC	
ABC/3TC	
TDF/FTC	
TDF/FTC/EFV	
TDF/FTC/RPV	
TAF/FTC/RPV	
TDF/3TC/DOR	
TDF/FTC/EVG/cob	
TAF/FTC/EVG/cob	
ABC/3TC/DTG	
TAF/FTC/BCG	
RPV/DTG	
3TC/DTG	
TAF/FTC **	
TAF/FTC/DRV **	
DRV/cobi **	

\* en cours de remboursement (Novembre 2021)  
 \*\* non commercialisés en France

# TasP

## Treatment as prevention

- Débuter le traitement **dans les 14 jours** (cas général)

### Objectifs :

- Contrôle de la réplication virale
- Restauration de l'immunité
- Réduction des EI liés aux traitements

**Privilégier combinaisons fixes en cp unique**  
**Formes injectables (1/2 mois)**

**Contrôle virologique à 3-6 mois**

The slide has a blue geometric background. At the top, there are three logos: 'anrs MALADIES INFECTIEUSES EMERGENTES Inserm', 'CNS Conseil national du sida et des hépatites virales', and 'HAS HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ'. The main text in the center reads 'Nouvelles recommandations de traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH'. At the bottom, a red box contains the text 'quels changements pour la pratique clinique ?'.

anrs MALADIES INFECTIEUSES EMERGENTES Inserm

CNS Conseil national du sida et des hépatites virales

HAS HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Nouvelles recommandations de traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH

quels changements pour la pratique clinique ?

*Webinaire ANRS, 15/11/2024*



# TPE

**U < 48 heures**

**Tableau 1: Indications au TPE après exposition sexuelle lorsque la personne source vit avec le VIH**

Risque et nature de l'exposition	Partenaire source vivant avec le VIH CV détectable	Partenaire source vivant avec le VIH CV <50 copies/ml et TARV ≥6 mois
Rapport anal réceptif	TPE recommandé	TPE non recommandé
Rapport anal insertif	TPE recommandé	TPE non recommandé
Rapport vaginal réceptif	TPE recommandé	TPE non recommandé
Rapport vaginal insertif	TPE recommandé	TPE non recommandé
Rapports oro-génitaux	TPE non recommandé*	TPE non recommandé


\*En cas de féllation réceptive avec charge virale >1000 copies/mL documentée chez le partenaire source, un TPE est à discuter au cas par cas.

**Tableau 2B : Indications au TPE lorsque le statut VIH de la personne source ne peut pas être déterminé (classé par risque d'exposition)**

Risque et nature de l'exposition	HSH ou personne transgenre	Partenaire d'un groupe de prévalence ≥1% (hors HSH ou personne transgenre)*	Activité sexuelle en groupe et/ou sous produits psychoactifs, Violences sexuelles*	Autres situations avec partenaire de statut VIH inconnu
Rapport anal réceptif	TPE recommandé	TPE recommandé	TPE à discuter	TPE à discuter
Rapport anal insertif	TPE recommandé	TPE à discuter	TPE à discuter	TPE non recommandé
Rapport vaginal	TPE recommandé	TPE à discuter	TPE à discuter	TPE non recommandé
Rapports oro-génitaux	TPE non recommandé	TPE non recommandé	TPE non recommandé	TPE non recommandé
Projection cutanée ou muqueuse de sperme ou sécrétions génitales	TPE non recommandé	TPE non recommandé	TPE non recommandé	TPE non recommandé



## Algorithme d'indication au TPE après exposition sexuelle



\* sauf féllation réceptive et charge virale documentée > 1000 cp/ml chez le sujet source

# TPE : Traitement

Recommandations HAS juillet 2024

**U < 48 heures**

## Délai d'instauration

Le TPE doit être instauré le plus tôt possible, idéalement dans les 4 h, et jusqu'à 48 h suivant l'exposition. (Grade C) Au-delà de ce délai, et notamment sur la période allant de 48 à 72 h post exposition, les données de la littérature ne montrent pas de protection significative.

Le traitement post-exposition recommandé en 1<sup>re</sup> intention est l'association de **ténofovir-dipropoxil (TDF) (245 mg), lamivudine (3TC) (300 mg) ou emtricitabine (FTC) (200 mg) et de doravirine (DOR) (100 mg)**. (AE)

- Soit comprimé unique quotidien de TDF/3TC/DOR (245/300/100 mg). Cette option combine l'avantage du comprimé unique et d'un coût réduit.
- Soit 2 comprimés en une prise quotidienne de TDF/FTC (245/200 mg) et DOR (100 mg). Cette option a l'avantage d'un coût encore plus bas que le comprimé unique. Quand cela est souhaité, elle permet d'enchaîner sur la PrEP par TDF/FTC en supprimant simplement le comprimé de DOR.




## Durée de traitement

La durée du TPE est de 30 jours




ou



+



= PrEP



\* sauf fellation réceptive et charge virale documentée > 1000 cp/ml chez le sujet source

# EXPOSITION SEXUELLE +/- TPE : bilans

## Bilan à J0

### Si pas de TPE :

- Bilan à S6
- VIH, Syphilis, CT/NG

### Si TPE sans PrEP :

- Bilan à S10
- VIH, Syphilis, CT/NG

### Si TPE sans PrEP mais **risque hépatite\*** :

- Bilan S12
- VIH, VHB, VHC, ALAT, Syphilis, CT/NG

### Si on enchaîne sur la PrEP :

- Bilan à S4
- VIH, IgG anti VHA, ALAT/créat, Syphilis, CT/NG

#### Toute exposition au sang ou sexuelle

- Sérologie VIH
- Sérologie VHB : Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc (sauf si immunité antérieure documentée ou statut connu)
- Sérologie VHC

#### En cas de TPE

- ALAT
- Créatinine + DFG

#### En cas d'exposition sexuelle

- Sérologie syphilis
- PCR chlamydia + gonocoque :
- Frottis pharyngé (rapport oro-génital)
- Frottis anal (rapport anal)
- Auto-prélèvement vaginal ou 1<sup>er</sup> jet d'urines (si pénis)

(1) « risque hépatite » : pour l'hépatite B, personne non immunisée contre le VHB. Pour l'hépatite C, pratique anale traumatique, sujet source usager de drogues intraveineuses, chemsex, sujet source vivant avec le VHC non traité

# PrEP

## Prophylaxie pré-exposition

Pour se former : [www.formaprep.org](http://www.formaprep.org)

Toute personne avec un haut risque d'exposition au VIH doit pouvoir bénéficier de la PrEP

Primo-prescription ouverte aux **médecins généralistes** depuis **2021**

**PrEP = Emtricitabine 200 / Tenofovir disoproxil 245**



FormaPrEP

MÉMO POUR VOTRE PRATIQUE

# LA PRÉP EN MÉDECINE DE VILLE


ÉDITION 2025

INITIATION ET SUIVI

PARIS SEINE-  
SAINT-DENIS  
SANS SIDA

PARIS SEINE-  
SAINT-DENIS  
LES BONNES  
REFLEXES

# PrEP



# PrEP : traitement

PrEP = Emtricitabine 200 / Tenofovir disoproxil 245

1 comprimé par jour

Prise **continue** ou **discontinue**

Renouvellement après bilan biologique tous les 3-6 mois

*(A l'initiation : bilan à 1 mois puis tous les 3-6 mois)*



Prise continue : tout le monde.



**Hommes cis** ou personnes trans avec rapports **anaux** exclusifs et **sans infection par le VHB**

*Diffusion muqueuse vaginale : 7 jours*



**Femmes cis**, personnes trans avec rapports **vaginaux**, ou personnes **infectées par le VHB**

# PrEP : traitement

PrEP = Emtricitabine 200 / Tenofovir disoproxil 245

1 comprimé par jour

Prise **continue** ou **discontinue**

Renouvellement après bilan biologique tous les 3-6 mois

*(A l'initiation : bilan à 1 mois puis tous les 3-6 mois)*

Prise **discontinue** : **hommes cis** ou **personnes trans avec rapports anaux exclusifs** et personnes non infectées par le VHB



# PrEP : traitement

**PrEP = Emtricitabine 200 / Tenofovir disoproxil 245**

1 comprimé par jour

Prise **continue ou discontinue**

Renouvellement après bilan biologique tous les 3-6 mois

*(A l'initiation : bilan à 1 mois puis tous les 3-6 mois)*

Pour débiter la prise : **2 comprimés** en une seule prise, **2 à 24 heures avant RS**

Pour poursuivre : **1 comprimé à heure fixe** par rapport aux 2 comprimés initiaux

Pour arrêter : **2 prises aux heures prévues après** le dernier RS



# PrEP : bilans de suivi

## Avant de débiter

Créatinine, DFG  
ALAT

VIH  
*VHA (HSH)*  
VHB  
VHC  
Syphilis

PCR CT/NG 3 sites

*b-HCG*

## Bilan M1

Créatinine, DFG  
ALAT

VIH

## Bilan long cours

Créatinine, DFG  
ALAT

VIH  
Syphilis  
VHC : **1 fois par an**

*VHA et VHB : non vacciné*

PCR CT/NG 3 sites

*B-HCG*

# PrEP : ETP



# LA PREP

mode d'emploi

Petit guide pour les (futurs-es) utilisateurs-rices de Prep

Membre de la Coalition Internationale Sida P. 05



# PrEP : perspectives

## CABOTEGRAVIR en IM toutes les 8 semaines

Avis HAS 27 juin 2024

la Commission considère qu'APRETUDE (cabotégavir) apporte une amélioration mineure du service médical rendu (ASMR IV) par rapport à l'association fixe emtricitabine / ténofovir disoproxil (TRUVADA) en schéma d'administration continue, lorsqu'APRETUDE (cabotégavir), associé à des pratiques sexuelles à moindre risque, dans la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour réduire le risque d'infection par le VIH-1 par voie sexuelle chez les adultes et les adolescents à haut risque de contamination et pesant au moins 35 kg.

Bons résultats chez les femmes cisgenres

Risques de résistance et primo-infections atypiques (LEVI)

USA : autorisé dans l'indication PrEP depuis 2021



# Réduction des risques UDD

## Chiffres clés

**342 000** usagers problématiques de drogues\*  
 → **129 000** ont pratiqué l'injection intraveineuse au moins une fois dans l'année (2019)

En 2019 **177 000 personnes** environ ont reçu un médicament pour leur dépendance aux opioïdes (MSO)

**724 décès** par surdose en 2022

\* Les « usagers problématiques de drogues » sont définis par l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA) comme des usagers de drogues par voie intraveineuse ou usagers réguliers d'opioïdes, cocaïne ou amphétamines durant l'année passée parmi les 15-64 ans.

Sources : Drogues et addictions, chiffres clés, OFDT, 2022 ; Profils et pratiques des usagers reçus en CAARUD en 2019, Tendances n° 142, OFDT, Décembre 2020 ; Enquête DRAMES 2022.

En 2019 **92 500 personnes** suivies dans 151 CAARUD\*\* en France

8 personnes sur 10 sont des hommes

Les usagers sont marqués par la précarité, une forte morbidité psychiatrique et un usage de multiples substances  
**21 %** n'ont aucun revenu  
**48 %** ont un revenu social uniquement

\*\*Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD).



**29**

Caarud (Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers-ères de Drogues gérés par AIDES



Près de **DEUX MILLIONS** De seringues à usage unique distribuées



**4 870** Tests de dépistages VIH effectués auprès de personnes usagères de drogues



**5,1 %**

Des personnes testées dépistées positives à une hépatite C et accompagnées vers le soin



# Réduction des risques UDD

- Création des SCMR (salles de consommation à moindre risque) en 2016
- Associations : distribution de matériel (AIDES, SAFE,...)
- Possibilité de se former à la RDR (SAFE)



## Association SAFE

11, av. de la Porte de la Plaine  
75015 PARIS  
FRANCE

## Nous contacter

Tél : 01 40 09 04 45  
Fax : 01 40 09 08 81  
E-mail : [contact@safe.asso.fr](mailto:contact@safe.asso.fr)

À COMPTER DU 3 JUIN 2024, L'ACCUEIL DE SAFE EST TRANSFÉRÉ AU 26 RUE DE CRONSTADT - 75015 PARIS  
Les locaux sont toujours ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h.  
Il est préférable de passer vos commandes à l'avance par téléphone : 01 40 09 04 45 ou mail : [contact@safe.asso.fr](mailto:contact@safe.asso.fr)  
Les soins et accompagnements infirmiers sont tous sur rendez-vous.  
A bientôt !

### DISPOSITIF RDR À DISTANCE

SERVICE GRATUIT DE CONSEIL PERSONNALISÉ  
ET D'ENVOI DE MATÉRIELS DE CONSOMMATION  
POUR USAGERS DE DROGUES

Association SAFE	Chambre OFFICE
Chambre LE PUYO	Chambre TEMPO
Chambre G	Chambre LILLE
Chambre L'ACCOTTE	Chambre INTERME SE
Chambre CESE	Chambre PARIS A CHÊTES
Chambre PASSEBELLE DE	Chambre G. SPOT - BLOUP


## Automates de réduction des risques

Les automates de réduction des risques sont des appareils permettant de distribuer des kits de matériels de consommation à moindres risques et de collecter les seringues usagées, 7j/7 et 24h/24.

Selon le modèle d'automate, les kits de réduction des risques délivrés sont les suivants : Kit d'injection 1ml, kit d'injection 2ml et kit crack.

SAFE gère 88 automates de réduction des risques, à Paris et en Ile-de-France.

# Point rapide sur le chemsex



HSH +...  
Plusieurs jours de sexe  
Cathinones  
Desinhibition  
Vulnérabilité  
Consentement  
Addiction  
Marginalisation  
Risque vital (20% de décès)

Étude nationale du phénomène du chemsex  
en France : une collaboration  
interlaboratoire sous l'égide de la Société  
française de toxicologie analytique (SFTA)



*Chemsex in France: a national study through interlaboratory collaboration  
under the auspices of the French Society of Analytical Toxicology (SFTA)*

**CHEMSEX**  
NOUS CONTACTER  
AIDES  
Membre de la Coalition Internationale Sida

PLAISIR ET PRODUITS, PARLONS-EN  
CONSUMER, RÉDUIRE LES RISQUES,  
SE PROTÉGER :  
DISPOSITIF D'ÉCOUTE ET DE SOUTIEN  
À DISTANCE

LIGNE WHATSAPP : 07 62 93 22 29  
GROUPE FACEBOOK : AIDES INFO CHEMSEX

**ChemSex**  
Mieux s'informer

ChemSex | Mieux s'informer

SURDOSAGE = DANGER / Risque élevé de dépendance

Lire attentivement la notice

# Point rapide sur le chemsex

RDR : association SAFE, association AIDES



Cartographie des lieux ressources (Paris) :

<https://www.paris.fr/pages/chemsex-ou-en-parler-21306>

Documentaire :

<https://www.youtube.com/watch?v=QTo7qQqfk4w>



**Chemsex, où en parler ?**



Pour en savoir plus sur les dispositifs d'accompagnement, rendez-vous sur → [paris.fr/chemsex](https://paris.fr/chemsex)

En cas d'urgence, contactez le SAMU ou les pompiers

15 SAMU OU 18 POMPIERS

# Orientation en **CSAPA**

**CSAPA : Centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addicologie.**

- CSAPA généralistes, CJC, parents jeunes enfants...
- Annuaire sur le site : [annuaire.action-sociale.org](http://annuaire.action-sociale.org)

## Ile-de-France

**Ile-de-France : 72 CSAPA**

Paris : 19 CSAPA

Seine-et-Marne : 6 CSAPA

Yvelines : 4 CSAPA

Essonne : 7 CSAPA

Hauts-de-Seine : 7 CSAPA

Seine-Saint-Denis : 14 CSAPA

Val-de-Marne : 9 CSAPA

Val-d'Oise : 6 CSAPA

# Orientation en CAARUD

**CAARUD : Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.**

- Structures portées par : associations, établissements publics de santé, ou CSAPA eux-mêmes.
- Liste sur le site : [annuaire.action-sociale.org](http://annuaire.action-sociale.org)

## 75 - Paris

9 CAARUD dans le département de [Paris](#)

[CAARUD AIDES 75](#) ☆

[Paris](#) (75002)

[CAARUD CENTRE BEAUREPAIRE](#) ☆

PARIS (75010)

[CAARUD PPMU - GAIA](#) ☆

PARIS (75011)

[CAARUD NOVA DONA](#) ☆

PARIS (75014)

[CAARUD CHARON OPPELIA](#) ☆

PARIS (75018)

[CAARUD ESPOIR GOUTTE D'OR](#) ☆

PARIS (75018)

[CAARUD ASSOCIATION AUREORE](#) ☆

PARIS (75018)

[CAARUD BOREAL](#) ☆

PARIS (75019)

[CAARUD KALEIDOSCOPE](#) ☆

PARIS (75019)



# 04

## La contraception en consultation de santé sexuelle

La mienne est dans mon bras	La mienne est au cuivre	La mienne est en latex	La mienne est sans ordonnance	La mienne dure 3 ans
La mienne n'est pas contraignante	La mienne est hebdomadaire	La mienne est en comprimés	La mienne est sur ma peau	La mienne est discrète
La mienne est définitive	La mienne est pratique	→ CHOISIR SA CONTRACEPTION		

Découvrez tous les modes de contraception et trouvez celui qui vous convient le plus.


# Etat des lieux

## Un paysage contraceptif en mutation

*En 2023, 91,0% des femmes de 18 à 49 ans concernées ont recours à un moyen de contraception, le dispositif intra-utérin (DIU ou stérilet) devient la méthode la plus utilisée (27,7%) suivi de la pilule (26,8%) et du préservatif (18,6%)*

## Des grossesses non souhaitées en augmentation

*En 2023, 34,7% des dernières grossesses survenues dans les 5 ans sont non souhaitées*



# En consultation

Outils / supports

Le meilleur contraceptif = celui choisi définitivement par le ou la patient.e

Une consultation dédiée

Examen clinique, biologique, anamnèse

Examen gynécologique facultatif

Contraception masculine :  
*Institut Arthur Vernes Paris 6 Dr SOUFIR*



# En consultation

**Toujours rechercher une endométriose en présence de signes évocateurs.**

*Attention : IRM pelvienne si patiente n'ayant jamais eu de RS.*

*Imageries : centre radiologie expert*

**Aide : [www.resendo.fr](http://www.resendo.fr)**

## PARIS

**ALANI Rasha**  
Centre de l'endométriase  
60 rue Gay Lussac  
75005 Paris  
6 place d'Italie  
et 74 avenue des Gobelins  
75013 Paris  
01 43 36 36 33

**PETIT Erick**  
Centre de l'endométriase  
60 rue Gay Lussac  
75005 Paris  
01 43 36 36 33

**LEVY Ronaldo**  
100 avenue Denfert Rochereau  
75014 Paris  
01 47 12 64 64 rdv Doctolib

**DESPORTES Emilie**  
Centre imagerie Duroc  
5-9ter boulevard du  
Montparnasse  
75006 Paris  
01 47 34 69 97 rdv Doctolib

**METZGER Ulrike**  
Echographie uniquement  
> Centre d'échographie de l'Odéon  
122 boulevard St-Germain  
75007 Paris  
01 55 42 77 00  
> Institut Mutualiste Montsouris  
42 boulevard Jourdan  
75014 Paris  
01 56 61 62 63

**DECHOUX Sophie**  
5 rue Faidherbe  
75011 Paris  
01 40 09 65 65

**LEMOUTON Théo**  
Sage femme échographiste  
45 rue de Montreuil  
75011 Paris 06 46 48 67 03

**MARTINS DA COSTA Carla**  
Centre d'Imagerie Diderot  
75012 Paris  
rdv Doctolib

**ROZE Mathilde**  
Médecin généraliste et  
échographiste  
15 rue Montgallet  
75012 Paris rdv Doctolib

**FLORIN Marie**  
17 avenue d'Italie  
75013 Paris  
01 45 83 05 63 rdv Doctolib

**GAYET Mathilde**  
17 avenue d'Italie  
75013 Paris  
01 45 83 05 63

**IFERGAN Jonathan**  
64 rue Labrousse  
75015 Paris  
[Docteur.jonathan.ifergan@gmail.com](mailto:Docteur.jonathan.ifergan@gmail.com)

**VALIERE Martine**  
Radiologue bilan fertilité  
19 rue Jean Giraudoux  
75016 Paris  
01 45 63 69 86

**FERRETTI Caterina**  
Gynécologue obstétricienne  
96 avenue de Villiers  
75017 Paris  
09 51 97 30 47 rdv Doctolib

**BOUILLON Sabrina**  
Sage femme & Echographiste  
Centre médical  
association Marie-Thérèse  
> 31 rue Pajol  
75018 Paris  
> 1 bis allée Alquier Debrousse  
75020 Paris  
01 44 12 84 44 / 84 45



Espace vie affective,  
relationnelle et sexuelle

05

---

**Education des jeunes à  
la santé sexuelle**

# EVARS : est-ce le rôle du médecin traitant ?

## Code de la santé publique

### ▣ **Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)**

#### ▣ Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4444-3)

#### ▣ Livre Ier : Professions médicales (Articles L4111-1 à L4163-11)

#### Titre III : Profession de médecin (Articles L4130-1 à L4135-2)

### ▣ **Chapitre préliminaire : Médecin généraliste de premier recours et médecins spécialistes de premier ou deuxième recours.** (Articles L4130-1 à L4130-2)

#### > Article L4130-1

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 68

Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :

1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;

# Valorisation de la consultation santé sexuelle

## Première consultation de contraception, de prévention en santé sexuelle (mineurs)

**NGAP : CCP**

**Tarif : 47,5 euros**

Prise en charge par l'AM : 100 %

Possible une seule fois par patient.e

Aborder essentiellement : risque IST, contraception, vaccination HPV.

Le médecin doit informer le ou la patient.e. mineur.e. du droit à l'anonymat pour cette prestation et doit respecter la décision du patient.

Pour ce faire, il utilise le cas échéant un NIR anonyme : 2 55 55 55 CCC 042/XX ou 1 55 55 55 CCC 042/XX (CCC étant le numéro de la caisse et XX la clé de contrôle) et indiquer la date de naissance réelle de l'assuré.e.<sup>(8)</sup>.

# Et les CPTS ?

## Dégager des dynamiques éducatives et de formation via les CPTS

### Quel rôle sur le territoire et auprès des patients ?

Les CPTS remplissent 6 missions de service public reconnues depuis 2019 :

- ▶ faciliter l'accès aux soins, notamment celui des patients sans médecin traitant, pour améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
- ▶ mettre en place des parcours répondant aux besoins des territoires pour renforcer la prise en charge et le suivi des patients, éviter les ruptures de parcours et favoriser le maintien à domicile de patients complexes, handicapés, âgés...
- ▶ initier des actions territoriales de prévention, de dépistage, de promotion de la santé en fonction des besoins du territoire
- ▶ contribuer au développement de la qualité et de la pertinence des soins pour favoriser l'échange de bonnes pratiques médicales et soignantes
- ▶ accompagner les professionnels de santé, par exemple en facilitant l'accueil de stagiaires
- ▶ participer à la réponse aux crises sanitaires par un plan d'action adapté.

*Source : sante.gouv.fr*

# Aller-vers : jeunes à risque

## Exemple du service Espace Santé Jeunes de l'Hôtel-Dieu

### Recevoir les jeunes de 13 à 21 ans en situation de rupture pour :

- Effectuer un bilan de santé
- Entamer un suivi généraliste (médecin traitant)
- Suivre les pathologies chroniques
- Faire de l'ETP et de l'éducation à la sexualité

Effectuer des actions de prévention en milieu scolaire ou médico-social

Faire de la recherche



 **FORMA**  
Santé Sexuelle

 **AIDES**  
Membre de la Coalition  
Internationale Sida 

**CRIPS ÎLE-DE-FRANCE**

Le Centre régional d'information et de prévention du sida et  
pour la santé des jeunes

**FormaPrEP**

 **Sida Info Service.org**  
**0 800 840 800**  
Appel confidentiel, anonyme et gratuit

 **RÉSEAU DE  
PRÉVENTION  
DES ADDICTIONS**

 **Corevih**  
Ile-de-France • Centre

 **SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE LÛTE  
CONTRE LE SIDA**

06

 **RSSP**  
Réseau de Santé Sexuelle Publique

**Centre de santé  
sexuelle Paris Centre**  
Une prise en charge globale  
en santé sexuelle

Qui peut m'aider ?

 **VILLE DE  
PARIS**

**ASSISTANCE  
PUBLIQUE**  **HÔPITAUX  
DE PARIS**

 **Santé  
publique  
France**

 **SEXO  
SAFE**

# Ressources

- CeGIDD : Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic (annuaire sur le site de sida info service)
- CSS (centre de santé sexuelle, ex-CPEF centres de planification et d'éducation familiale) (annuaire sur le site [ivg.gouv.fr](http://ivg.gouv.fr))
- COREVIH : instance régionale de coordination des actions de prévention et de prise en charge. (liste sur le site de la SFLS)
- EVARS : Espaces vie affective, relationnelle et sexuelle : pas d'actes médicaux (annuaire sur le site [ivg.gouv.fr](http://ivg.gouv.fr))
- Centres IntimAgir : information, orientation et écoute des personnes en situation de handicap (annuaire sur le site [monparcourshandicap.gouv.fr](http://monparcourshandicap.gouv.fr))
- Orthogénie et IVG : recherche des praticiens sur le site [sante.fr](http://sante.fr) via le moteur de recherche.
- Santé Publique France : **production documentaire**
- Sida info services
- Services de santé étudiante (annuaire : [https://services.dgesip.fr/T213/S989/sante\\_des\\_etudiants](https://services.dgesip.fr/T213/S989/sante_des_etudiants))
- CRIPS (centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes) site : [lecrips-idf.net](http://lecrips-idf.net)



# CSS Paris Centre



Information – Prévention – Dépistage

## Centre de santé sexuelle Paris Centre

Une prise en charge globale en santé sexuelle

### Le Centre de santé sexuelle Paris-Centre vous propose :

- Des informations
- Des accompagnements (*psychologue, sexologue, assistante sociale...*)
- Dépistage des IST
- Des contraceptions régulières (*pilule, implant...*) - contraceptions d'urgence
- Des traitements de prophylaxie pré-exposition (PrEP) ou post-exposition (TPE) au VIH
- Des Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD)
- Des autotests VIH
- Des consultations spécialisées

**Avec ou sans rendez-vous de 9h à 19h**

**HÔTEL-DIEU, AP-HP**  
1 Place Parvis Notre-Dame  
Paris 4<sup>e</sup>  
Galerie A1 / 6<sup>e</sup> étage  
Tél. : 01 42 34 83 00  
E-mail : [css.paris.htd@aphp.fr](mailto:css.paris.htd@aphp.fr)

Plus d'informations : [www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)

#### Métro

Ligne 1 : Hôtel de Ville  
Ligne 4 : Cité  
Lignes 7 et 14 : Châtelet  
Ligne 10 : Cluny ou Maubert-Mutualité

#### RER

Lignes B ou C : Saint-Michel

#### Bus

Lignes 21 - 24 - 27 - 47 - 38 - 85 - 96

#### Voiture

Pas de parking dans l'hôpital  
Parkings publics à proximité :  
Parvis Notre-Dame, Palais de Justice,  
Mutualité ou Hôtel de Ville



ASSISTANCE  
PUBLIQUE



HÔPITAUX  
DE PARIS

# Je souhaite me former

Pour vous former à la santé sexuelle :

- [www.formasantesexuelle.fr](http://www.formasantesexuelle.fr)
- [Guide : Aborder la santé sexuelle en consultation - SFLS/RSSP - RÉSEAU DE SANTÉ SEXUELLE PUBLIQUE \(RSSP\)](#)
- [Guide de premier recours en sexologie - Pour s'y retrouver, en parler, dépister en orienter - RÉSEAU DE SANTÉ SEXUELLE PUBLIQUE \(RSSP\)](#)

Pour vous former à la prescription et au suivi de PrEP :

- [www.formaprep.org](http://www.formaprep.org)



FormaPrEP



# Je souhaite me former

Pour vous former à la pratique d'IVG :

- [www.revho.fr/formations](http://www.revho.fr/formations)

Pour vous former à l'hormonothérapie de transition de genre :

- [www.reseausantetrans.fr/formations](http://www.reseausantetrans.fr/formations)



# Je souhaite me former

## DU santé sexuelle pour tous.tes (SU):

- <https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-sante-sexuelle-pour-toustes/>

## DU sexologie clinique et sexothérapie (UPC):

- [https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sciences-technologies-sante-STS/diu-sexologie-clinique-et-sexotherapie-XUK4\\_101.html](https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sciences-technologies-sante-STS/diu-sexologie-clinique-et-sexotherapie-XUK4_101.html)

## DU MST et infection par le VIH (UPC):

- [https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1/sciences-technologies-sante-STS/du-maladies-sexuellement-transmissibles-et-infection-a-vih-en-france-DUMVIIM\\_114.html](https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1/sciences-technologies-sante-STS/du-maladies-sexuellement-transmissibles-et-infection-a-vih-en-france-DUMVIIM_114.html)

## DIU formation complémentaire en gynécologie et obstétrique pour médecins généralistes (SU) :

- <https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/diu-formation-complementaire-en-gynecologie-et-obstetrique-pour-medecins-generalistes/>

## DU prise en charge de la transidentité (SU):

- <https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/prise-en-charge-de-la-transidentite/>

## DU contraception et prévention en santé des femmes (SU):




- <https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-contraception-prevention-sante-femmes/>

## DU études complémentaires en andrologie (UPC):

- [https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1/sciences-technologies-sante-STS/du-etudes-complementaires-en-andrologie-XUP8\\_121.html](https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1/sciences-technologies-sante-STS/du-etudes-complementaires-en-andrologie-XUP8_121.html)



# Ressources littéraires



# Merci

---

Pourriez-vous remplir ce questionnaire  
avant de nous quitter ?

**Scannez le QR code à droite !**



**Samuel Etien**

Médecin généraliste chez AP-HP, Assistance Publique -  
Hôpitaux de Paris



Contact par email : [samuel.etien@aphp.fr](mailto:samuel.etien@aphp.fr)